

rovi NAKAI)、ひめさんせうばら (*Rosa koreana* KOM.)、うらぼしぎくら (*Prunus Maackii* RUPR.)、だふりあふうろ (*Geranium davricum* DC.)、まんしうりはだかへで (*Acer tegmentosum* KOM.)、だいげきさいこ (*Bupleum euphorbioides* NAKAI)、こけもも (*Vaccinium Vitis-Idæa* L.)、えぞのくがいさう (*Veronica sibirica* L.)、まつばゆり (*Lilium cernuum* KOM.)。

## II. 南方分子ノ北限ト認メルベキモノハ

いぬしで (*Carpinus Tschonoskii* MAXIM.)、しらき (*Excæcasia japonica* MÜLL.)、やまごぼう (*Phytolacca esculenta* HOUTT. 神興寺で栽培)。



第2圖 はなぶささう (1700 m ノ灌木帯中ニ散生ス)

## V. 朝鮮半島ニ於ケル初發見ノモノ

みやましほがま (*Pedicularis apodochila* MAXIM.)。

以上ノヤウナモノガ最モ顯著ナル事實デアルガ、其他、尙あかしで、さんせう、えごのき (東草驛カラ神興寺ニ至ル途中ノ川ノ堤防ニハ數個所コノ純林ガアル) ノ如キ 暖地性ノモノハ、更ニ北上シテ金剛山デ其ノ北限トナリ、たうしらべ、てうせんもみ、てうせんまつ、ノヤウナ寒地性ノ森林モヨク發達シテキル。

然シ分布上最モ興味アルノハだいせんきやらぼくと共ニ本州ノ高山分子ト共通ナルみやましほがまノ所在デアル。

寫眞撮影ニツイテハ昆蟲採集ノタメ同行サレタ畏友田中三夫氏ヲ煩ハシタ點ガ多イ。此處ニ厚ク謝シマス。

## III. 金剛山トノ共通種

はなぶささう (*Hanabusa-ya asiatica* NAKAI)、ほそばおほりんだう (*Gentiana Uchiyama* NAKAI) ひかげまこな (*Melampyrum latifolium* NAKAI) まるばれんげふ (*Forsythia ovata* NAKAI)。

## IV. 伯耆國大山ト共通種

だいせんきやらぼく (*Taxus caespitosa* NAKAI.)。

## 〇おほえのころトささきびトノ學名ニツイテ (中井猛之進)

おほえのころノ學名ハ屢ニ變更サレタ。其順序ヲ示スト次ノ通り

1. *Panicum comosum* STEUDEL, Synopsis Plantarum Glumacearum pars I. Gramineæ, 417 (1855). {non *Panicum comosum* STEUDEL, l.c. 53 quæ est planta Philippinensis}.

2. *Panicum pycnocomum* STEUDEL, l.c. 462 in Indice.
3. *Panicum viride* LINNÆUS var. *gigantea* FRANCHET & SAVATIER, Enumeratio Plantarum in Japonia sponte crescentium hucusque rite cognitarum etc. II, 162 (1876).
4. *Setaria viridis* BEAUVOIS var. *gigantea* FR. & SAV. apud MATSUMURA, Catalogus of Plants in the Herbarium of the College of Science, Imperial University, 225 (1886).
5. *Setaria gigantea* MAKINO in Botanical Magazine, Tokyo XXV, 227 (1911).
6. *Chaetochloa comosa* KOIDZUMI, Floræ Symbolæ Orientali-Asiaticæ 51 (V, 1930)
7. *Setaria comosa* HONDA in Journal of the Faculty of Science, Imperial University of Tokyo, Section III Botany, Vol. III Part 1, 440 (XII, 1930).

要スルニ<sup>ステウデル</sup>STEUDEL 氏が最初ニ日本ニナイ<sup>フキリッピン</sup>ノ禾本ニ *Panicum comosum* ノ名ヲ與ヘテ置キナガラ、復タ日本ノおほえのころニ同種名ヲ附ケタ後、同一書内ノ目錄中デ *Panicum pycnocomum* Steud. lege 417. 215 loco: *comosum*. (417 頁ノ 215 番ノ *Panicum comosum* ノ所ハ *Panicum pycnocomum* ト讀ムベシ) ト訂正シタノヲ後ノ學者共が見落シタ事カラ始マルノデアル。其故此名ヲ探ツテ *Setaria pycnocomma* ト誰カガシテ置イタラ問題ハナカッタノデアル。筆者が大正 14 年ノ 4 月 3 日(金)ニ和蘭國 Leiden 市ニ在ル Rijksherbarium (國立腊葉館) デ STEUDEL 氏ノ檢定シタ日本ノ禾本科植物ノ新種ヲ見テキタ時ニ同館員 Dr. J. TH. HENRARD 博士 (禾本科ノ専門家デアル。氏ノ姓ハ鼻ニカケテ「フンラード」ト發音スル) ガ出テ來テ「此 *Panicum pycnocomum* STEUDEL ハ *Setaria pycnocomma* ト訂正スベキデアル。亞米利加ノ SCRIBNER ガ *Chaetochloa* ナル屬名ヲ用キルノハ愚デアル。彼ノ言フ *Setaria* = homonym ノアルトイフノハ始メ<sup>アカリウス</sup>ACHARIUS 氏が地衣類ノ *Parmelia* 屬ノ節名ニ *Setaria* ナル名ヲ用キ後<sup>ミシヨ</sup>MICHAUX 氏ガ之ヲ獨立ノ屬名ニシタケレドモ今ハ誰モ其ノナ名ヲ用キル人ハナイシ又隱花植物ト顯花植物トハ別ニシナケレバナラヌ」ト説明シテ呉レタ。此隱花植物ト顯花植物トヲ別ニスルトイフ氏ノ説ハ今日ハ通ラナイガ *Setaria* ナル名ハ命名規則デ保留名トサレタカラ *Setaria pycnocomma* ハ採ラネバナラヌ其故

*Setaria pycnocomma* (STEUDEL) HENRARD ex ore ipsius, in Apr. 3, 1935.

Syn. *Panicum pycnocomum* STEUDEL, Syn. Glum. I 462 in indice.

おほえのころ

トナル譯デアル。STEUDEL 氏がおほえのころニ *Panicum comosum* ナル名ヲ附ケテ發表シタ時異名ニ *An? P. verticillatum* α *majus* Thunb. ト疑念ヲ持チ乍ラ加ヘテ居ルガ<sup>ウブサラ</sup>筆者が大正 14 年ノ 6 月ニ瑞典國 Uppsala 市ノ<sup>ウブサラ</sup>大學デ THUNBERG 氏ノ標本ヲ見タラ *Panicum verticillatum* α *major* THUNBERG, Flora Japonica 46 (1784) ハ標本ニハ *Panicum verticillatum* β トナツテ居リ *Setaria italica* あはノ標本ガ 2 本貼ツテアル。而シテ β. *minor* THUNBERG ハ標本デハ α トナツテ居テ *Setaria viridis* えのころぐさ

ノ標本ガ2本貼ツテアツタ。其故 THUNBERG 氏ハおほえのころハ採集シテモ亦見テモ居ナカッタノデアル。序ニえのころぐさトあハトハ大變似テ居テ「あハえのころぐさカ又ハおほえのころカヲ栽培シテ變ツタモノデアラウ」ト云フノヲ屢々キクカラ其區別ヲ書イテ置カウ。あハニハ第4類即チ硬化シテキル類ノ内側ニ雄花ノ退化ニヨツテ出來タ小サナ *Palea* (花穎) ガ一個アルガえのころぐさニハナイ。之ガ兩種ノ區別點デアツテ本來別種デアル。

尙ホおほえのころト同日ニ見タノハささきび<sup>オホワチヤマ</sup>ガ *Panicum paucisetum* STEUDEL デアルコト、いぬあハガ *Panicum chondrachne* STEUDEL デアルコト、ハひぬめリガ *Panicum contractum* NEES ex STEUDEL デアルコトナドデアル。いぬあハトハひぬめリトハ本田博士ガ氣附イテ詳細ニ發表シテアルコト故繰返ス必要ハナイガささきびノ學名ハ次ノ様ニシナケレバナラス。

*Panicum paucisetum* STEUDEL, Syn. Glum. 52 no. 221 (1855).

Syn. *Setaria excurrens* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 275 (1866), excl. syn.; pro parte, syn. nov.

*Panicum excurrens* (non TRINIUS) FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, 161 (1876).

*Panicum plicatum* (non LAMARCK) HENRY in Trans. Asiat. Soc. XXIV Suppl. 106 (1896); MAKINO in Tokyo Bot. Mag. X 67 (1896), etc.

*Panicum neurodes* (non SCHULTES) HACKEL in Bull. Herb. Boiss. VIII, 644 (1899), 2 sér IV, 528 (1904), etc.

*Setaria mariscus* MATUDA in Tokyo Bot. Mag. XXIV, 173 (1910).

(和名) ささきび

而シテ此基準標本ハ BUERGER 氏ノ九州デノ採集品デアル。ささきびノ名ニ屢々用キラレ又ハ用キラレタ *Panicum plicatum* LAMARCK, *Panicum neurodes* SCHULTES, *Panicum mauritianum* WILLDENOW ex SPRENGEL, *Panicum nepalensis* SPRENGEL, *Panicum nervosum* ROXBURGH, *Panicum excurrens* TRINIUS 等ハ皆日本領ニナイ禾本デアル。

又ハひぬめリノ學名ニ間違ヘテ用キラレタ *Panicum indicum* LINNEUS ノ原種ハ穂ノ長サガ 1 cm 弱ノモノデー見シテハひぬめリトハ見分ケラレル。

## 〇こきじのをごけ (小雉尾蘚) ノ新産地 (堀川芳雄)

昭和9年ニ筆者ニヨリ新種トシテ發表サレタこきじのをごけ (*Cyathophorella densifolia* HORIKAWA) ハ本州デハ伊勢國大内山ニ産スルコトガ報告サレテキタニ過ギナイ。今度、安藝ノ福王寺山、大和ノ大臺ケ原山並ニ入ノ波温泉、相州ノ元箱根ニモ本種ノ産スルコトガ明白トナツタ。ヨツテ原始林中ノ樹皮面ヲ仔細ニ探セバ更ニ廣ク各地ニ見ツカルデアラウト信ゼラレル。きじのをごけ (*Cy. japonica* BROTH.) ヨリモ遙カニ小サク光澤ノ無い白黄綠色デ、葉ノ縁邊ニハ舷部 (Saum) ガヨク發達シテキルノデ區別ハ容易デアル。